

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

+ Pilon
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)

C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 7 d'Avril 1961

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Les dernières pluies ont provoqué des projections d'ascospores, mais les périthèces ne sont pas encore vides et de nouvelles contaminations sont possibles.

Aussi un nouveau traitement est conseillé pour protéger les feuilles et les jeunes fruits.

VIGNE

Black-Rot : Le traitement conseillé le 24 mars devrait être étendu à tous les foyers de 1960 afin de prévenir les contaminations primaires.

Utiliser l'un des produits conseillés contre le Mildiou de la Vigne.

Mildiou : Aucun risque actuel. Attendre nos informations.

INFORMATIONS

ARBRES FRUITIERS

Oïdium du Pommier : Contre cette maladie, nous rappelons l'intérêt du traitement qui coïncide avec la fin de la floraison des variétés sensibles.

Tavelure du Pêcher : Dans les vergers où la maladie est à redouter, il serait utile de prévoir un deuxième traitement, dès réception de cette note.

VIGNE

Oïdium : Les premières manifestations de la maladie viennent d'être signalées. Pour éviter l'extension du parasite, il serait utile d'effectuer un soufrage par beau temps dans les foyers habituels et sur les cépages sensibles.

Pour les vignes qui seront traitées contre le Black-Rot on incorporera un soufre mouillable à la Bouillie.

Cigariers : Contre les attaques de Cigariers, dont les premières viennent d'être découvertes, utiliser une spécialité à base de D.D.T.

.../...

P 14

Araignées rouges : Des pullulations d'Araignées rouges sont signalées dans plusieurs régions viticoles. Nous rappelons la nécessité du traitement conseillé dans notre précédent bulletin.

Erinose : Cet Acarien, par ses piqûres provoque la formation de boursouflures à la face supérieure des feuilles. Au dessous, on observe un feutrage blanc ou rosé, qui peut aussi apparaître sur quelques grappes avant la floraison.

Le soufrage préconisé contre l'Oïdium pourra limiter l'extension des manifestations qui sont peu graves dans l'ensemble.

Phylloxera : En raison de l'évolution précoce du parasite on devrait appliquer dès à présent un traitement avec une spécialité à base de Lindane en émulsion dans les parcelles d'hybrides producteurs directs où les premières galles apparaissent.

Bordeaux, le 17 avril 1961

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

*
* *
*

Le SERVICE d'EXPLOITATION INDUSTRIELLE des TABACS communique (Dordogne, Charente, Charente-Maritime) :

Mildiou du Tabac : Tabaculteurs n'oubliez pas de traiter vos semis :

Faites un traitement tous les quatre jours dès que le plant a deux feuilles (cotylédons non compris).

Pour les cinq premiers traitements, il faut prévoir pour 10 M² de semis :

- 2 litres de bouillie, soit, 2 litres d'eau et 8 Grs de Dithane Z 78 (soit environ le volume de produit contenu dans une cuillerée à bouche arasée).

Pour les traitements suivants :

- environ 2 litres,5 de bouillie, soit, 2 L,5 d'eau et 10 grammes de Dithane Z 78 pour 10 M² .